

レジメンコード 015037

レジメン名称 EPd 3コース目以降

投与間隔 28 日

備考 DEX28mg day1 (e1o投与3-24hr前) (75歳以上8mg)、DEX40mg day8, 15, 22 (75歳以上20mg)、ホマリトミド day1-21

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① ①開始と同時に解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] エムプリシティ点滴静注用300mg ○化学療法で実施 ③ ■■3コース目初回投与■■■ 00~30分 3.0mL/分 (180mL/h) 30分以降 4.0mL/分 (240mL/h) ■■4コース目以降■■■ 5.0mL/分 (300mL/h) ペースで注入	250 m L 20 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 15分  — 以下余白 —	50 m L	