

レジメンコード 015065

レジメン名称 Isa+d (75歳未満) 2コース目以降

投与間隔 28 日

備考 Isa投与前にアセトアミノフェン内服、DEX：40mg day8. 22内服

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L 5 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] サークリサ点滴静注500mg [25mL/瓶] ○化学療法で実施 ② ◆全量 250mL◆ 注意！下記「mg/hr」を「mL/hr」に変換すること ▼▼▼サークリサ点滴速度換算表 参照▼▼▼ ■■投与法 (初回投与時) ■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 225mg/hr 90～120分 275mg/hr 120～150分 325mg/hr 150～180分 375mg/hr 180～210分 400mg/hr ■■投与法 (2回目以降の投与時) ■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 275mg/hr 90～120分 375mg/hr 120分以降 400mg/hr	250 m L 20 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015065

レジメン名称 Isa+d (75歳未満) 2コース目以降

投与間隔 28 日

備考 Isa投与前にアセトアミノフェン内服、DEX：40mg day8. 22内服

病日 15 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L 5 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] サークリサ点滴静注500mg [25mL/瓶] ○化学療法で実施 ② ◆全量 250mL◆ 注意！下記「mg/hr」を「mL/hr」に変換すること ▼▼▼サークリサ点滴速度換算表 参照▼▼▼ ■■投与法 (初回投与時) ■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 225mg/hr 90～120分 275mg/hr 120～150分 325mg/hr 150～180分 375mg/hr 180～210分 400mg/hr ■■投与法 (2回目以降の投与時) ■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 275mg/hr 90～120分 375mg/hr 120分以降 400mg/hr	250 m L 20 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	