

レジメンコード 015069

レジメン名称 Isa単剤療法 2コース目以降

投与間隔 28 日

備考 Isa投与前にアセトアミノフェン内服

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg（サクシゾン） ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後）ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 5 瓶 1 管 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] サークリサ点滴静注500mg[25mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ ◆全量 250mL◆ 注意！下記「mg/hr」を「mL/hr」に変換すること ▼▼▼サークリサ点滴速度換算表 参照▼▼▼ ■■投与法（初回投与時）■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 225mg/hr 90～120分 275mg/hr 120～150分 325mg/hr 150～180分 375mg/hr 180～210分 400mg/hr ■■投与法（2回目以降の投与時）■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 275mg/hr 90～120分 375mg/hr 120分以降 400mg/hr	250 m L 20 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015069

レジメン名称 Isa単剤療法 2コース目以降

投与間隔 28 日

備考 Isa投与前にアセトアミノフェン内服

病日 15 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg（サクシゾン） ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後）ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 5 瓶 1 管 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] サークリサ点滴静注500mg[25mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ ◆全量 250mL◆ 注意！下記「mg/hr」を「mL/hr」に変換すること ▼▼▼サークリサ点滴速度換算表 参照▼▼▼ ■■投与法（初回投与時）■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 225mg/hr 90～120分 275mg/hr 120～150分 325mg/hr 150～180分 375mg/hr 180～210分 400mg/hr ■■投与法（2回目以降の投与時）■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 275mg/hr 90～120分 375mg/hr 120分以降 400mg/hr	250 m L 20 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	