

レジメンコード016001

レジメン名称 LSG15プロトコールA (ATL；急性型・リンパ腫型)

投与間隔 7日

備考 PSL (内服) 40mg/m² day 1、G-CSF (皮下注) day 2-6

病日 1日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	100 mL 40 mg/m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 mL 1 mg/m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間	500 mL 350 mg/m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 mL	