

レジメンコード 016003

レジメン名称 LSG15プロトコールC (ATL；急性型・リンパ腫型)

投与間隔 7日

備考 PSL (内服) 40mg/m² day 1-3、G-CSF (皮下注) day 4-6

病日 1日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m ²	
静脈内注射 (I V) [外来] 生理食塩液 (大塚生食注) [20mL/A] 注射用フィルデシン注3mg ○化学療法で実施 ③	20 m L 2.4 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト ^ド 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 016003

レジメン名称 LSG15プロトコールC (ATL ; 急性型・リンパ腫型)

投与間隔 7 日

備考 PSL (内服) 40mg/m² day 1-3、G-CSF (皮下注) day 4-6

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サント」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L 100 m g / m ²	

レジメンコード 016003

レジメン名称 LSG15プロトコールC (ATL ; 急性型・リンパ腫型)

投与間隔 7 日

備考 PSL (内服) 40mg/m² day 1-3、G-CSF (皮下注) day 4-6

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトボシド点滴静注液100mg「サント」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L 100 m g / m ²	