

レジメンコード 018001
レジメン名称 アザシチジン
投与間隔 28 日
備考

病日 1 日目

ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ビダーザ注射用100mg ○化学療法で実施 ① IVにつき注射用水4mLで溶解する — 以下余白 —	20 mL 75 mg/m ²	

レジメンコード 018001
レジメン名称 アザシチジン
投与間隔 28 日
備考

病日 2 日目

ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ビダーザ注射用100mg ○化学療法で実施 ① IVにつき注射用水4mLで溶解する — 以下余白 —	20 mL 75 mg/m ²	

レジメンコード 018001
レジメン名称 アザシチジン
投与間隔 28 日
備考

病日 3 日目

ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ビダーザ注射用100mg ○化学療法で実施 ① IVにつき注射用水4mLで溶解する — 以下余白 —	20 mL 75 mg/m ²	

レジメンコード 018001
レジメン名称 アザシチジン
投与間隔 28 日
備考

病日 4 日目

ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ビダーザ注射用100mg ○化学療法で実施 ① IVにつき注射用水4mLで溶解する — 以下余白 —	20 mL 75 mg/m ²	

レジメンコード 018001
レジメン名称 アザシチジン
投与間隔 28 日
備考

病日 5 日目

ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ビダーザ注射用100mg ○化学療法で実施 ① IVにつき注射用水4mLで溶解する — 以下余白 —	20 mL 75 mg/m ²	

レジメンコード 018001
レジメン名称 アザシチジン
投与間隔 28 日
備考

病日 6 日目

ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ビダーザ注射用100mg ○化学療法で実施 ① IVにつき注射用水4mLで溶解する — 以下余白 —	20 mL 75 mg/m ²	

レジメンコード 018001
レジメン名称 アザシチジン
投与間隔 28 日
備考

病日 7 日目

ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ビダーザ注射用100mg ○化学療法で実施 ① IVにつき注射用水4mLで溶解する — 以下余白 —	20 mL 75 mg/m ²	