

レジメンコード 019005

レジメン名称 Dara-CyBorD 1～2コース目

投与間隔 28 日

備考 Dara投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤内服、DEX 40mg（70歳以上20mg） day1, 8, 15, 22、CPA：300mg/m² day1, 8, 15, 22

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（S C） [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] ベルケイド 3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のベルケイド濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①	1.3 m g / m ² 5 m L	
皮下注射（S C） [外来] ダラキューロ配合皮下注[15mL/瓶] ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ② 3～5分かけて皮下投与 — 以下余白 —	15 m L	

レジメンコード 019005

レジメン名称 Dara-CyBorD 1～2コース目

投与間隔 28 日

備考 Dara投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤内服、DEX 40mg（70歳以上20mg） day1
, 8, 15, 22、CPA：300mg/m² day1, 8, 15, 22

病日 8 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（S C） [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] ベルケイド 3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のベルケイド濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①	1.3 m g / m ² 5 m L	
皮下注射（S C） [外来] ダラキューロ配合皮下注[15mL/瓶] ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ② 3～5分かけて皮下投与 — 以下余白 —	15 m L	

レジメンコード 019005

レジメン名称 Dara-CyBorD 1～2コース目

投与間隔 28 日

備考 Dara投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤内服、DEX 40mg（70歳以上20mg） day1
, 8, 15, 22、CPA：300mg/m² day1, 8, 15, 22

病日 15 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（S C） [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] ベルケイド 3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のベルケイド濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①	1.3 m g / m ² 5 m L	
皮下注射（S C） [外来] ダラキューロ配合皮下注[15mL/瓶] ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ② 3～5分かけて皮下投与 — 以下余白 —	15 m L	

レジメンコード 019005

レジメン名称 Dara-CyBorD 1～2コース目

投与間隔 28 日

備考 Dara投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤内服、DEX 40mg（70歳以上20mg） day1, 8, 15, 22、CPA：300mg/m² day1, 8, 15, 22

病日 22 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（S C） [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] ベルケイド 3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のベルケイド濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①	1.3 m g / m ² 5 m L	
皮下注射（S C） [外来] ダラキューロ配合皮下注[15mL/瓶] ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ② 3～5分かけて皮下投与 — 以下余白 —	15 m L	