

レジメンコード 190001
 レジメン名称 ACNU/Bev
 投与間隔 42 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|-----------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] ニドラン静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分 | 50 m L 80 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL [16mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分 | 100 m L 10 m g / kg | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 — | 50 m L | |

レジメンコード 190001
 レジメン名称 ACNU/Bev
 投与間隔 42 日
 備考

病日 15 日目

ページ数：2/3

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|--|-----------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL[16mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分 | 100 m L 10 m g /kg | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分 — 以下余白 — | 50 m L | |

レジメンコード 190001
 レジメン名称 ACNU/Bev
 投与間隔 42 日
 備考

病日 29 日目

ページ数：3/3

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|--|-----------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL[16mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分 | 100 m L 10 m g /kg | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分 — 以下余白 — | 50 m L | |