

レジメンコード190003

レジメン名称 ACNU/TMZ (200mg/m²)

投与間隔 42 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 後) リノロサル注射液2mg (0.4%) [0.5mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 2 管	
静脈内注射 (I V) [外来] ニドラン静注用50mg 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分 — 以下余白 —	80 m g / m ² 40 m L	

レジメンコード 190003

レジメン名称 ACNU/TMZ (200mg/m²)

投与間隔 42 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。(2.5mg/mL) 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分 — 以下余白 —	200 m g / m ²	

レジメンコード 190003

レジメン名称 ACNU/TMZ (200mg/m²)

投与間隔 42 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。(2.5mg/mL) 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分	200 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード190003

レジメン名称 ACNU/TMZ (200mg/m²)

投与間隔 42 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。(2.5mg/mL) 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分 — 以下余白 —	200 m g / m ²	

レジメンコード 190003

レジメン名称 ACNU/TMZ (200mg/m²)

投与間隔 42 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。(2.5mg/mL) 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分 - 以下余白 -	200 m g / m ²	

レジメンコード 190003

レジメン名称 ACNU/TMZ (200mg/m²)

投与間隔 42 日

備考

病日 6 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。(2.5mg/mL) 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分 — 以下余白 —	200 m g / m ²	