

レジメンコード190004

レジメン名称 ACNU（グリオーマ初期）

投与間隔 63 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パック <sup>®</sup> 1mg/50mL 「HK」 後）リノロサル注射液2mg（0.4%）[0.5mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 2 管	
静脈内注射（I V） [外来] 注射用水（大塚蒸留水）[20mL/A] ニドラン静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分  — 以下余白 —	40 m L 80 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード190004

レジメン名称 ACNU（グリオーマ初期）

投与間隔 63 日

備考

病日 36 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 後）リノロサル注射液2mg（0.4%）[0.5mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 2 管	
静脈内注射（I V） [外来] 注射用水（大塚蒸留水）[20mL/A] ニドラン静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分  — 以下余白 —	40 m L 80 m g / m <sup>2</sup>	