

レジメンコード190011

レジメン名称 High-Dose MTX (5g/m<sup>2</sup>)

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 重ソー注 (炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	500 m L 20 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 重ソー注 (炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L 20 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 重ソー注 (炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5時間	500 m L 20 m L	
— 以下余白 —		



レジメンコード190011

レジメン名称 High-Dose MTX (5g/m<sup>2</sup>)

投与間隔 14 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 最大量超過認識済み メイロン注 [7%250mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	3000 m L  200 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 12 : 00に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 18 : 00に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 24 : 00に投与開始 点滴時間 30分  — 以下余白 —	50 m L 15 m g	

レジメンコード 190011  
 レジメン名称 High-Dose MTX (5g/m<sup>2</sup>)  
 投与間隔 14 日  
 備考

病日 4 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 最大量超過認識済み メイロン注 [7%250mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	3000 m L  200 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注 3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 06 : 00 に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注 3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 12 : 00 に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注 3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 18 : 00 に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注 3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 24 : 00 に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
— 以下余白 —		

レジメンコード 190011  
 レジメン名称 High-Dose MTX (5g/m<sup>2</sup>)  
 投与間隔 14 日  
 備考

病日 5 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 最大量超過認識済み メイロン注 [7%250mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	3000 m L  200 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注 3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 06 : 00 に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注 3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 12 : 00 に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注 3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 18 : 00 に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注 3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 24 : 00 に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
— 以下余白 —		

レジメンコード190011  
 レジメン名称 High-Dose MTX (5g/m<sup>2</sup>)  
 投与間隔 14 日  
 備考

病日 6 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 最大量超過認識済み メイロン注 [7%250mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	3000 m L  200 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 06 : 00に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 12 : 00に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 18 : 00に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 24 : 00に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
— 以下余白 —		