

レジメンコード 190013

レジメン名称 PAV

投与間隔 56 日

備考 塩酸プロカルバジン 60mg/m<sup>2</sup> day8-21

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL 「HK」 後) リノロサル注射液 2mg (0.4%) [0.5mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 2 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ニドラン静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 70 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 190013

レジメン名称 PAV

投与間隔 56 日

備考 塩酸プロカルバジン 60mg/m<sup>2</sup> day8-21

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコピン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 1.4 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 190013

レジメン名称 PAV

投与間隔 56 日

備考 塩酸プロカルバジン 60mg/m<sup>2</sup> day8-21

病日 29 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコピン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 1.4 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		