

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 1 日目

ページ数：1/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分	75 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL[16mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 10 m g / kg	
— 以下余白 —		

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 2 日目

ページ数：2/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 3 日目

ページ数：3/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 4 日目

ページ数：4/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 5 日目

ページ数：5/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 6 日目

ページ数：6/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 7 日目

ページ数：7/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  - 以下余白 -	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 8 日目

ページ数：8/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  - 以下余白 -	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 9 日目

ページ数：9/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 10 日目

ページ数：10/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 11 日目

ページ数：11/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 12 日目

ページ数：12/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 13 日目

ページ数：13/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 14 日目

ページ数：14/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 15 日目

ページ数：15/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分	75 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL[16mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 10 m g / kg	
— 以下余白 —		

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 16 日目

ページ数：16/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  - 以下余白 -	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 17 日目

ページ数：17/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分	75 m g / m <sup>2</sup>	
- 以下余白 -		

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 18 日目

ページ数：18/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 19 日目

ページ数：19/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  - 以下余白 -	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 20 日目

ページ数：20/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 21 日目

ページ数：21/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 22 日目

ページ数：22/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  - 以下余白 -	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 23 日目

ページ数：23/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 24 日目

ページ数：24/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  - 以下余白 -	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 25 日目

ページ数：25/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 26 日目

ページ数：26/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 27 日目

ページ数：27/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分	75 mg/m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 28 日目

ページ数：28/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  - 以下余白 -	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 29 日目

ページ数：29/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分	75 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL[16mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 10 m g / kg	
— 以下余白 —		

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 30 日目

ページ数：30/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  - 以下余白 -	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 31 日目

ページ数：31/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 32 日目

ページ数：32/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 33 日目

ページ数：33/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分	75 mg/m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 34 日目

ページ数：34/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分	75 m g / m <sup>2</sup>	
- 以下余白 -		

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 35 日目

ページ数：35/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 36 日目

ページ数：36/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 37 日目

ページ数：37/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  - 以下余白 -	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 38 日目

ページ数：38/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  - 以下余白 -	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 39 日目

ページ数：39/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 40 日目

ページ数：40/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分	75 mg/m <sup>2</sup>	
- 以下余白 -		

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 41 日目

ページ数：41/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  — 以下余白 —	75 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190015  
 レジメン名称 TMZ/Bev 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 42 日目

ページ数：42/42

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分	75 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL[16mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 10 m g / kg	
— 以下余白 —		