

レジメンコード190017

レジメン名称 TMZ/Bev 維持 (200mg/m²)

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分	200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL[16mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 10 m g / kg	
— 以下余白 —		

レジメンコード190017

レジメン名称 TMZ/Bev 維持 (200mg/m²)

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分 - 以下余白 -	200 m g / m ²	

レジメンコード190017

レジメン名称 TMZ/Bev 維持 (200mg/m²)

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分 - 以下余白 -	200 m g / m ²	

レジメンコード190017

レジメン名称 TMZ/Bev 維持 (200mg/m²)

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分 - 以下余白 -	200 m g / m ²	

レジメンコード190017

レジメン名称 TMZ/Bev 維持 (200mg/m²)

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分 — 以下余白 —	200 m g / m ²	

レジメンコード190017

レジメン名称 TMZ/Bev 維持 (200mg/m²)

投与間隔 28 日

備考

病日 15 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] アバスタチン点滴静注用400mg/16mL[16mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分 — 以下余白 —	100 m L 10 m g /kg	