

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 1 日目

ページ数：1/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>— 以下余白 — | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 2 日目

ページ数：2/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                 | <メモ> |
|--|----------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                  |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 mg/m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 3 日目

ページ数：3/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 4 日目

ページ数：4/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 5 日目

ページ数：5/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 6 日目

ページ数：6/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 7 日目

ページ数：7/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 8 日目

ページ数：8/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |



レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 9 日目

ページ数：9/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 10 日目

ページ数：10/42

| <薬品名・用法>  | <用量>                    | <メモ> |
|---|-------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分  | 1 袋                     |      |
| 点滴注射（D I V）<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>— 以下余白 — | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 11 日目

ページ数：11/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>— 以下余白 — | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 12 日目

ページ数：12/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 13 日目

ページ数：13/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 14 日目

ページ数：14/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分 | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |
| - 以下余白 -   |                         |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 15 日目

ページ数：15/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 16 日目

ページ数：16/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |



レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 17 日目

ページ数：17/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 18 日目

ページ数：18/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 19 日目

ページ数：19/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 20 日目

ページ数：20/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 21 日目

ページ数：21/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 22 日目

ページ数：22/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                 | <メモ> |
|--|----------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                  |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 mg/m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 23 日目

ページ数：23/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 24 日目

ページ数：24/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |



レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 25 日目

ページ数：25/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 26 日目

ページ数：26/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 27 日目

ページ数：27/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 28 日目

ページ数：28/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 29 日目

ページ数：29/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分 | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |
| - 以下余白 -   |                         |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 30 日目

ページ数：30/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 31 日目

ページ数：31/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>— 以下余白 — | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 32 日目

ページ数：32/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |



レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 33 日目

ページ数：33/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 34 日目

ページ数：34/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 35 日目

ページ数：35/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 36 日目

ページ数：36/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 37 日目

ページ数：37/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分 | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |
| - 以下余白 -   |                         |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 38 日目

ページ数：38/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>— 以下余白 — | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 39 日目

ページ数：39/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 40 日目

ページ数：40/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |



レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 41 日目

ページ数：41/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |

レジメンコード 190018  
 レジメン名称 Temozolomide 初発  
 投与間隔 70 日  
 備考 放射線照射と併用

病日 42 日目

ページ数：42/42

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分   | 1 袋                     |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テモダール点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL<br>必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。<br>点滴時間 1時間30分<br><br>- 以下余白 - | 75 m g / m <sup>2</sup> |      |