

レジメンコード190020

レジメン名称 Temozolomide 維持 (200mg/m<sup>2</sup>)

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  - 以下余白 -	200 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード190020

レジメン名称 Temozolomide 維持 (200mg/m<sup>2</sup>)

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  - 以下余白 -	200 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード190020

レジメン名称 Temozolomide 維持 (200mg/m<sup>2</sup>)

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  - 以下余白 -	200 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード190020

レジメン名称 Temozolomide 維持 (200mg/m<sup>2</sup>)

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  - 以下余白 -	200 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード190020

レジメン名称 Temozolomide 維持 (200mg/m<sup>2</sup>)

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テモダール点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルあたり注水41mLで溶解する。2.5mg/mL 必要量を注射用水100mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 1時間30分  - 以下余白 -	200 m g / m <sup>2</sup>	