

レジメンコード 241006

レジメン名称 PHD (初回)

投与間隔 21 日

備考 術前・術後補助化学療法も可

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タレウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] パージェタ点滴静注420mg/14mL ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 840 m g	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ハーセプチン注射用150[7.2mL/150mg/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 8 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) ドセタキセル点滴静注80mg/4mL 「ニプロ」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 75 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		