

レジメンコード 241007

レジメン名称 PHD (継続)

投与間隔 21 日

備考 術前・術後補助化学療法も可

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タ体ウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] パージェタ点滴静注420mg/14mL ○化学療法で実施 ② 2回目以降は30分まで短縮可能 点滴時間 1時間	250 m L 420 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ハーセプチン注射用150[7.2mL/150mg/B] ○化学療法で実施 ③ 2回目以降は30分まで短縮可能 点滴時間 1時間30分	250 m L 6 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) ドセタキセル点滴静注80mg/4mL 「ニプロ」 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 75 m g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		