

レジメンコード 242002

レジメン名称 PAC/HER (初回4mg/kg)

投与間隔 28 日

備考 投与量 (mg) = 抜き取り量 (mL) × 21 (mg/mL)

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] ハーセプチン注射用150 [7.2mL/150mg/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 4 m g / kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分	50 m L	
- 以下余白 -		

レジメンコード 242002

レジメン名称 PAC/HER (初回4mg/kg)

投与間隔 28 日

備考 投与量 (mg) = 抜き取り量 (mL) × 21 (mg/mL)

病日 8 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] ハーセプチン注射用60 [3mL/60mg/B] ○化学療法で実施 ④ 2回目以降は30分まで短縮可能 点滴時間 1時間30分	250 m L 2 m g / kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 242002

レジメン名称 PAC/HER (初回4mg/kg)

投与間隔 28 日

備考 投与量 (mg) = 抜き取り量 (mL) × 21 (mg/mL)

病日 15 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] ハーセプチン注射用60 [3mL/60mg/B] ○化学療法で実施 ④ 2回目以降は30分まで短縮可能 点滴時間 1時間30分	250 m L 2 m g / kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 242002

レジメン名称 PAC/HER (初回4mg/kg)

投与間隔 28 日

備考 投与量 (mg) = 抜き取り量 (mL) × 21 (mg/mL)

病日 22 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ハーセプチン注射用60[3mL/60mg/B] ○化学療法で実施 ② 2回目以降は30分まで短縮可能 点滴時間 1時間30分	250 m L 2 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	