

レジメンコード 242011
 レジメン名称 PHwPAC PH (初回) +PAC
 投与間隔 7 日
 備考 PH：3週毎、PAC：3投1休

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] パージェタ点滴静注420mg/14mL ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 840 m g	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	100 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] ハーセブチン注射用150 [7.2mL/150mg/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間30分	250 m L 8 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	