

レジメンコード 240003  
 レジメン名称 FEC (100)  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] エピルピシン塩酸塩注射用50mg [NK] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L 500 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 500 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分  - 以下余白 -	50 m L	