

レジメンコード 240013  
 レジメン名称 GEM/PAC  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

| <薬品名・用法>  | <用量>                                 | <メモ> |
|---|--------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>後) ファモチジン注射液20mg「ト-ワ」[2mL/管]<br>ポララミン注5mg[1mL/A]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分 | 50 m L<br>3 瓶<br>1 管<br>1 管          |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 30分   | 1 袋                                  |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注 [500mL/B]<br>後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピ-ラ」<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 3時間  | 500 m L<br>175 m g / m <sup>2</sup>  |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後) ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」<br>○化学療法で実施<br>④<br>点滴時間 30分   | 100 m L<br>1250 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>点滴時間 10分<br><br>- 以下余白 -  | 50 m L                               |      |

レジメンコード 240013  
レジメン名称 GEM/PAC  
投与間隔 21 日  
備考

病日 8 日目

ページ数：2/2

| <薬品名・用法>  | <用量>                                 | <メモ> |
|---|--------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」<br>デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分 | 1 袋<br>1 瓶                           |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後) ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 30分                   | 100 m L<br>1250 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 10分<br><br>— 以下余白 —                      | 50 m L                               |      |