

レジメンコード 244004  
 レジメン名称 PHA (初回)  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

| <薬品名・用法>   | <用量>                    | <メモ> |
|--|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」<br>デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分        | 1 袋<br>1 瓶              |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>パージェタ点滴静注420mg/14mL<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 1時間                             | 250 m L<br>840 m g      |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 30分  | 100 m L                 |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>ハーセプチン注射用150[7.2mL/150mg/B]<br>○化学療法で実施<br>④<br>点滴時間 1時間30分                  | 250 m L<br>8 m g /kg    |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>アブラキサン点滴静注用100mg<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>1バイアルあたり生食20mLで溶解する。<br>必要量を生食100mLの空バッグに入れる。<br>点滴時間 30分 | 260 m g /m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑥<br>点滴時間 10分   | 50 m L                  |      |
| — 以下余白 —   |                         |      |