

レジメンコード 244006

レジメン名称 atezolizumab/ABI

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] テセントリク点滴静注840mg [14mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 初回60分 初回投与時、忍容性良好で2回目以降30分 点滴時間 1時間	250 m L 840 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ ④以降、フィルターなしのルートを使用 ◆◆アブラキサンはフィルター禁のため◆◆ 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) アブラキサン点滴静注用100mg 1バイアルあたり生食20mLで溶解する 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 5分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 244006  
 レジメン名称 atezolizumab/ABI  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「夕休」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) アブラキサン点滴静注用100mg 1バイアルあたり生食20mLで溶解する 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 244006

レジメン名称 atezolizumab/ABI

投与間隔 28 日

備考

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] テセントリク点滴静注840mg [14mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 初回60分 初回投与時、忍容性良好で2回目以降30分 点滴時間 1時間	250 m L 840 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ ④以降、フィルターなしのルートを使用 ◆◆アブラキサンはフィルター禁のため◆◆ 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) アブラキサン点滴静注用100mg ○化学療法で実施 1バイアルあたり生食20mLで溶解する 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる ⑤ 点滴時間 30分	100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 5分  — 以下余白 —	50 m L	