

レジメンコード 245008

レジメン名称 Halaven/CBDCA (triweekly) (イット有)

投与間隔 21 日

備考 AUC 2

病日 1 日目

ページ数：1/2

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分 | 1 袋 1 瓶 1 管 | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ハラヴェン静注1mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分 | 50 m L 1.4 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間 | 250 m L 0 m g / A | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 5分 — 以下余白 — | 50 m L | |

レジメンコード 245008

レジメン名称 Halaven/CBDCA (triweekly) (イット有)

投与間隔 21 日

備考 AUC 2

病日 8 日目

ページ数：2/2

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|--|------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「夕休」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分 | 1 袋 1 瓶 | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ハラヴェン静注1mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分 | 50 m L 1.4 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分 — 以下余白 — | 50 m L | |