

レジメンコード150001

レジメン名称 5-FU

投与間隔 7 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	250 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後)ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始後、1時間後に投与開始。 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始。 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 15分	50 m L 20 m g /kg	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液[500mL/B] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間 - 以下余白 -	500 m L 1 管	