

レジメンコード 150002

レジメン名称 ACT-D

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン静注用0.5mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分	50 m L 0.01 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150002

レジメン名称 ACT-D

投与間隔 14 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン静注用0.5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	50 m L 0.01 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150002

レジメン名称 ACT-D

投与間隔 14 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン静注用0.5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	50 m L 0.01 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
- 以下余白 -		

レジメンコード 150002

レジメン名称 ACT-D

投与間隔 14 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン静注用0.5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	50 m L 0.01 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150002

レジメン名称 ACT-D

投与間隔 14 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン静注用0.5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	50 m L 0.01 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	