

レジメンコード150008

レジメン名称 CAP

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 [100mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 50 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注 (光糖液5%) [5%100mL/B] ピノルビン注射用20mg ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 30 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	100 m L 500 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 4時間	500 m L	

レジメンコード 150008

レジメン名称 CAP

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 3時間	500 m L	
— 以下余白 —		