

レジメンコード150010

レジメン名称 CDDP/Radiation (DEX 9.9mg)

投与間隔 7 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[1L/袋] 前日より開始 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	1000 mL	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 mL	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②を開始してから1時間30分後に投与開始 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ④ ②終了後、投与開始 点滴時間 2時間	500 mL 40 mg/m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 mL	
点滴注射 (D I V) KN 1号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	500 mL	
点滴注射 (D I V) KN 3号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 3時間  — 以下余白 —	500 mL	

レジメンコード150010

レジメン名称 CDDP/Radiation (DEX 9.9mg)

投与間隔 7 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード150010

レジメン名称 CDDP/Radiation (DEX 9.9mg)

投与間隔 7 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード150010

レジメン名称 CDDP/Radiation (DEX 9.9mg)

投与間隔 7 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード150010

レジメン名称 CDDP/Radiation (DEX 9.9mg)

投与間隔 7 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L	