

レジメンコード 150011

レジメン名称 CPT-11

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パック [®] 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「タイホ」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 150011

レジメン名称 CPT-11

投与間隔 28 日

備考

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パック [®] 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「タイホ」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 150011

レジメン名称 CPT-11

投与間隔 28 日

備考

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「タイホ」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	