

レジメンコード 150012
 レジメン名称 CPT-11/254-S
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「タイホ」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] アクプラ静注用50mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	250 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) 塩酸 ^{ホク} プラミド ^ト 注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 1 管	

レジメンコード 150012
 レジメン名称 CPT-11/254-S
 投与間隔 28 日
 備考

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハッグ} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「タイホ」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) 塩酸オキサプラチン注射液10mg「タカ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 1 管	

レジメンコード 150012
 レジメン名称 CPT-11/254-S
 投与間隔 28 日
 備考

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「タイホ」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「タカ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L 1 管	
— 以下余白 —		