

レジメンコード 150013
 レジメン名称 CPT-11/CBDCA
 投与間隔 28 日
 備考 AUC 5

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「タイホ」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) KN 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150013
 レジメン名称 CPT-11/CBDCA
 投与間隔 28 日
 備考 AUC 5

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハッグ} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「タイホ」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) 塩酸オキサプラチン注射液10mg「タカ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150013
 レジメン名称 CPT-11/CBDCA
 投与間隔 28 日
 備考 AUC 5

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「タイホ」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) 塩酸オクロプラミド ^{ラミド} 注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L 1 管	
— 以下余白 —		