

レジメンコード 150014
 レジメン名称 CPT-11/CDDP
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[1L/袋] 前日より開始 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	1000 mL	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 mL	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②を開始してから90分後に投与開始 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) リナカ塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ④ ②終了後、投与開始 点滴時間 2時間	500 mL 60 mg/m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間	500 mL 60 mg/m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 mL	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 3時間	500 mL	

レジメンコード 150014
レジメン名称 CPT-11/CDDP
投与間隔 28 日
備考

病日 1 日目

ページ数：2/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 3時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150014
 レジメン名称 CPT-11/CDDP
 投与間隔 28 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：3/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150014
 レジメン名称 CPT-11/CDDP
 投与間隔 28 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：4/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150014
 レジメン名称 CPT-11/CDDP
 投与間隔 28 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：5/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L	
- 以下余白 -		

レジメンコード 150014
レジメン名称 CPT-11/CDDP
投与間隔 28 日
備考

病日 5 日目

ページ数：6/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150014
 レジメン名称 CPT-11/CDDP
 投与間隔 28 日
 備考

病日 8 日目

ページ数：7/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg 「SUN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) 塩酸オキサプラチン注射液10mg「タカ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150014
 レジメン名称 CPT-11/CDDP
 投与間隔 28 日
 備考

病日 15 日目

ページ数：8/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) イリテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「SUN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「タカ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 1 管	
— 以下余白 —		