

レジメンコード 150015  
 レジメン名称 CPT-11/MMC  
 投与間隔 14 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「タイホ」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5時間	500 m L 150 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) サクシゾン注射用100mg 後) ヒシファーゲン配合静注 [20mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 3時間30分	500 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後、投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] マイトマイシン注用2mg ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 10 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸 <sup>オク</sup> プラミド <sup>ラミド</sup> 注射液10mg「タカ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間  - 以下余白 -	500 m L 1 管	