

レジメンコード 150018
 レジメン名称 CYVADIC
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハッグ} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダカルバジン注用100 [100mg/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 mL 200 mg / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 mL 1 mg	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸 ^{トコプラミド} 注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間	500 mL 1 管	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸 ^{トコプラミド} 注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間	500 mL 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 mL 0.5 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150018
 レジメン名称 CYVADIC
 投与間隔 28 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハッグ} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダカルバジン注用100 [100mg/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg 「NK」 ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸 ^{ハク} ^{ラミト} 注射液10mg 「 ^{カク} 」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 4時間	500 m L	

レジメンコード 150018
 レジメン名称 CYVADIC
 投与間隔 28 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 6時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150018
 レジメン名称 CYVADIC
 投与間隔 28 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダカルバジン注用100 [100mg/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF 輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸 ^{ハク} プロプラミド ^{ラミド} 注射液10mg「 ^{カク} 」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田 ^{テバ} 」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸 ^{ハク} プロプラミド ^{ラミド} 注射液10mg「 ^{カク} 」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	500 m L 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150018
 レジメン名称 CYVADIC
 投与間隔 28 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハッグ} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ダカルバジン注用100[100mg/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸 ^{マクロプラミド} 注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150018
 レジメン名称 CYVADIC
 投与間隔 28 日
 備考

病日 5 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハッグ} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ダカルバジン注用100[100mg/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 m g	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「オクサ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 管	
- 以下余白 -		