

レジメンコード150022

レジメン名称 DOC

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ブドウ糖注（光糖液5%）[5%100mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 3 瓶	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後）ドセタキセル点滴静注用80mg/4mL「EE」 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 m L 70 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] 後）塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間  — 以下余白 —	500 m L	