

レジメンコード 150023  
 レジメン名称 DP (DEX 9.9mg)  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[1L/袋] 前日より開始 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	1000 mL	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 mL 70 mg/m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 mL 60 mg/m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[1L/袋] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 4時間	1000 mL 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 mL	
— 以下余白 —		

レジメンコード150023

レジメン名称 DP (DEX 9.9mg)

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード150023

レジメン名称 DP (DEX 9.9mg)

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード150023

レジメン名称 DP (DEX 9.9mg)

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150023  
レジメン名称 DP (DEX 9.9mg)  
投与間隔 21 日  
備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L	