

レジメンコード150025

レジメン名称 Doxil/BEV

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パップ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5%[250mL/袋] ドキシル注20mg [10mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は90分またはドキシル1mg/分 点滴時間 1時間30分	250 m L 40 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL [16mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 15 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 15分 - 以下余白 -	50 m L	