

レジメンコード 150028

レジメン名称 EJ

投与間隔 28 日

備考 AUC 5

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注 (光糖液5%) [5%100mL/B] サクシゾン300 [300mg/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 300 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] ビタメジン静注用 ビタミンC注「フー」 [500mg/2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 4時間	500 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150028

レジメン名称 EJ

投与間隔 28 日

備考 AUC 5

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サント」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] ビタメジン静注用 ビタミンC注「フナー」 [500mg/2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L 1 瓶 1 管	

レジメンコード 150028

レジメン名称 EJ

投与間隔 28 日

備考 AUC 5

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サント」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] ビタメジン静注用 ビタミンC注「フー」 [500mg/2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L 1 瓶 1 管	

レジメンコード 150028

レジメン名称 EJ

投与間隔 28 日

備考 AUC 5

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サント」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] ビタメジン静注用 ビタミンC注「フナー」 [500mg/2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L 1 瓶 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150028

レジメン名称 EJ

投与間隔 28 日

備考 AUC 5

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サント」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] ビタメジン静注用 ビタミンC注「フー」 [500mg/2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L 1 瓶 1 管	