

レジメンコード 150029

レジメン名称 EMACO

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①を開始してから1時間30分後に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン0.5mg ○化学療法で実施 ④ 側管 ③を開始してから30分後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用メソトレキセート50mg ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 12時間	500 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸トクゾ [®] ラミト [®] 注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	

レジメンコード 150029

レジメン名称 EMACO

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「オクサ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 5時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード 150029

レジメン名称 EMACO

投与間隔 14 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①を開始してから1時間30分後に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン0.5mg ○化学療法で実施 ④ 側管 ③を開始してから30分後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 m g	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸トクロピド [®] 注射液10mg「タカ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 5時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 1時間	50 m L 15 m g	

レジメンコード150029

レジメン名称 EMACO

投与間隔 14 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸トクロピド 注射液10mg [タカ] [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 6時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧を開始してから1時間後に投与開始 点滴時間 1時間	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150029

レジメン名称 EMACO

投与間隔 14 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注 3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	50 m L 15 m g	

レジメンコード 150029

レジメン名称 EMACO

投与間隔 14 日

備考

病日 8 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 注射用エンドキサン 500mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセト F 輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液 10mg 「タカ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用 1mg ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [200mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間	200 m L	
— 以下余白 —		