

レジメンコード 150031

レジメン名称 EP/EMA

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[1L/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	1000 mL	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液バッグ「フソー」 [1L/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	1000 mL 150 mg / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 12時間	500 mL 75 mg / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 2時間	500 mL 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3号輸液[500mL/B] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「オクサ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 12時間  — 以下余白 —	1000 mL 2 管	

レジメンコード 150031

レジメン名称 EP/EMA

投与間隔 14 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分	100 m L 1 瓶 2 管	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150031

レジメン名称 EP/EMA

投与間隔 14 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) 塩酸トコプラミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分	100 m L 1 瓶 2 管	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) 塩酸トコプラミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150031

レジメン名称 EP/EMA

投与間隔 14 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセト F 輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150031

レジメン名称 EP/EMA

投与間隔 14 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセト F 輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150031

レジメン名称 EP/EMA

投与間隔 14 日

備考

病日 8 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン静注用 0.5mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 0.5 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液 100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用メソトレキセート 50mg ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 12時間	500 m L 300 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		