

レジメンコード 150033

レジメン名称 GCB

投与間隔 21 日

備考 AUC 4

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL [16mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。	100 m L 15 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g /A	
点滴注射 (D I V) KN 3号輸液 [200mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	200 m L	

レジメンコード 150033

レジメン名称 GCB

投与間隔 21 日

備考 AUC 4

病日 8 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	