

レジメンコード 150035
 レジメン名称 GEM/BEV
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用 1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] アバスチン点滴静注用 400mg/16mL [16mL/B] ○化学療法で実施 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能 ③ 点滴時間 1時間30分	100 m L 15 m g / kg	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸 ^{ハク} プロラミド ^{ラミド} 注射液 10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸 ^{ハク} プロラミド ^{ラミド} 注射液 10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間	500 m L 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150035
レジメン名称 GEM/BEV
投与間隔 21 日
備考

病日 8 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用 1g 「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	