

レジメンコード 150037
レジメン名称 GEM/DOC
投与間隔 28 日
備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用 1g 「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 900 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間30分 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 150037
 レジメン名称 GEM/DOC
 投与間隔 28 日
 備考

病日 8 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 900 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L 75 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間 — 以下余白 —	500 m L	