

レジメンコード 150038
 レジメン名称 GEM/PLD
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 650 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5%[250mL/袋] ドキシル注20mg [10mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150038
 レジメン名称 GEM/PLD
 投与間隔 28 日
 備考

病日 8 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 650 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	