

レジメンコード150039
 レジメン名称 Ifosfamide
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①投与開始1時間後より開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タカウ」 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	

レジメンコード 150039
 レジメン名称 Ifosfamide
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：2/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 3時間	500 m L 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液 [500mL/袋] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑨と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑨投与開始1時間後より開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 3時間 ー 以下余白 ー	500 m L 1 管	

レジメンコード150039
 レジメン名称 Ifosfamide
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：3/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①投与開始90分後より開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] 後) 塩酸トコプラミド注射液10mg「タカタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	500 m L 1 管 1 管	

レジメンコード150039
 レジメン名称 Ifosfamide
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：4/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液 [500mL/袋] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑧投与開始1時間後より開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸トクロプラミド注射液10mg「タカ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 3時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード150039
 レジメン名称 Ifosfamide
 投与間隔 21 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：5/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①投与開始90分後より開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] 後) 塩酸トコプラミド注射液10mg「タカタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	500 m L 1 管 1 管	

レジメンコード 150039
 レジメン名称 Ifosfamide
 投与間隔 21 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：6/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液 [500mL/袋] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑧投与開始1時間後より開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸トクロプラミド [®] 注射液10mg「タカ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 3時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード150039
 レジメン名称 Ifosfamide
 投与間隔 21 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：7/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①投与開始90分後より開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] 後) 塩酸トコプラミド注射液10mg「タカタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	500 m L 1 管 1 管	

レジメンコード 150039
 レジメン名称 Ifosfamide
 投与間隔 21 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：8/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液 [500mL/袋] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑧投与開始1時間後より開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸トクロプラミド [®] 注射液10mg「タカ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 3時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード150039
 レジメン名称 Ifosfamide
 投与間隔 21 日
 備考

病日 5 日目

ページ数：9/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①投与開始90分後より開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	500 m L 1 管 1 管	

レジメンコード 150039
 レジメン名称 Ifosfamide
 投与間隔 21 日
 備考

病日 5 日目

ページ数：10/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液 [500mL/袋] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑧投与開始1時間後より開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸トクロプラミド [®] 注射液10mg「タカ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 3時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	