

レジメンコード150041  
レジメン名称 MTX-Folinic acid  
投与間隔 14 日  
備考

病日 1 日目

ページ数：1/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM） [外来] 注射用メソトレキセート50mg 注射用水（大塚蒸留水） [20mL/A] MTX50mg/Vを注水2mLで溶解する。（25mg/mL） ○化学療法で実施 ①  — 以下余白 —	1 m g /kg 20 m L	

レジメンコード150041  
レジメン名称 MTX-Folinic acid  
投与間隔 14 日  
備考

病日 2 日目

ページ数：2/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM） [外来] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ①  — 以下余白 —	0.1 m g /kg	

レジメンコード150041  
レジメン名称 MTX-Folinic acid  
投与間隔 14 日  
備考

病日 3 日目

ページ数：3/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM） [外来] 注射用メソトレキセート50mg 注射用水（大塚蒸留水） [20mL/A] MTX50mg/Vを注水2mLで溶解する。（25mg/mL） ○化学療法で実施 ①  — 以下余白 —	1 m g /kg 20 m L	

レジメンコード150041  
レジメン名称 MTX-Folinic acid  
投与間隔 14 日  
備考

病日 4 日目

ページ数：4/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM） [外来] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ①  — 以下余白 —	0.1 m g /kg	

レジメンコード150041  
レジメン名称 MTX-Folinic acid  
投与間隔 14 日  
備考

病日 5 日目

ページ数：5/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>筋肉注射（IM） [外来] 注射用メソトレキセート50mg 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] MTX50mg/Vを注水2mLで溶解する。(25mg/mL) ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1 m g /kg 20 m L</p>	

レジメンコード150041  
レジメン名称 MTX-Folinic acid  
投与間隔 14 日  
備考

病日 6 日目

ページ数：6/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM） [外来] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ①  — 以下余白 —	0.1 m g /kg	

レジメンコード150041  
レジメン名称 MTX-Folinic acid  
投与間隔 14 日  
備考

病日 7 日目

ページ数：7/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>筋肉注射（IM） [外来] 注射用メソトレキセート50mg 注射用水（大塚蒸留水） [20mL/A] MTX50mg/Vを注水2mLで溶解する。（25mg/mL） ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1 m g /kg 20 m L</p>	

レジメンコード150041  
レジメン名称 MTX-Folinic acid  
投与間隔 14 日  
備考

病日 8 日目

ページ数：8/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM） [外来] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ①  — 以下余白 —	0.1 m g /kg	