

レジメンコード 150044

レジメン名称 NGT

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1m g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 1.2 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸オキサプラチン注射液10mg「オクタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150044

レジメン名称 NGT

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1m g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 1.2 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸オキサプラチン注射液10mg「オクタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150044

レジメン名称 NGT

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1m g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 1.2 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸オキサプラチン注射液10mg「オクサ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150044

レジメン名称 NGT

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1m g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 1.2 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「オクサ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150044

レジメン名称 NGT

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1m g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 1.2 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸オキサプラチン注射液10mg「オクタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
— 以下余白 —		