

レジメンコード 150045
 レジメン名称 NGT/BEV
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ`1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 40分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1m g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	100 m L 1.25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	100 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL [16mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 15 m g / kg	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセットF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸オクゾプラミド`注射液10mg「オク」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
- 以下余白 -		

レジメンコード 150045
 レジメン名称 NGT/BEV
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 40分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1m g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	100 m L 1.25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150045
 レジメン名称 NGT/BEV
 投与間隔 21 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 40分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1m g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	100 m L 1.25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸オクロプラミド注射液10mg「オク」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150045
 レジメン名称 NGT/BEV
 投与間隔 21 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 40分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1m g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	100 m L 1.25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150045
 レジメン名称 NGT/BEV
 投与間隔 21 日
 備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 40分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1m g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	100 m L 1.25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
— 以下余白 —		