

レジメンコード150047

レジメン名称 PVB

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロキナーゼ6万-Wf[6万IU/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 6 万IU	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 10 m g	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 30分	100 m L 5 m g	

レジメンコード150047

レジメン名称 PVB

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード150047

レジメン名称 PVB

投与間隔 28 日

備考

病日 8 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロキナーゼ6万-Wf[6万IU/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 6 万IU	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] プレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L 10 m g	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	100 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード150047

レジメン名称 PVB

投与間隔 28 日

備考

病日 15 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロキナーゼ6万-Wf[6万IU/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 6 万IU	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] プレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L 10 m g	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	100 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		